



Czuwanie	Śpi głęboko	Spi płytko	Śpiący	Czuwa	Pobudzony
Nastrój	Spokojny	Lekko zaniepokojony	Niespokojny	Bardzo niespokojny	Panika
Reakcja na oddech respiratorowy	Nie kaszle, nie wykazuje spontanicznej aktywności oddechowej	Spontaniczna wentylacja z brakiem lub niewielką reakcją na oddech respiratorowy	Okresowo kaszel lub sprzeciwianie się oddechowi respiratorowemu	Aktywne oddechy przeciw oddechowi repiratorowemu lub regularny kaszel	Walka z oddechem respiratorowym, kaszel lub dławienie się
Płacz (dla noworodków i niemowląt oddychających spontanicznie)	Oddycha spokojnie, nie płacze	Łka lub sapie	Jęczy	Płacze	Krzyczy
Poruszanie się	Nie porusza się	Okresowe niewielkie ruchy	Częste, niewielkie ruchy	Energiczne ruchy ograniczone do kończyn	Energicznie porusza całym ciałem
Napięcie mięśni	Wiotki, brak napięcia mięśni	Obniżone	Prawidłowe	Wzmożone, zgięcie palców u rąk i stóp	Skrajna sztywność mięśni ze zgięciem palców dłoni i stóp
Mimika twarzy	Mięśnie twarzy zrelaksowane	Normalny tonus mięśni twarzy	Widoczne napięcie w niektórych mięśniach twarzy	Napięcie widoczne we wszystkich mięśniach twarzy	Twarz wykrzywiona w grymasie
MAP	Niższe	W normie	Wzrasta o 15% od czasu do czasu (1-3 razy w czasie obserwacji)	Wzrasta często o ponad 15% (> 3 razy w czasie obserwacji)	Stale podwyższone > 15%
HR	Niższe	W normie	Wzrasta o 15% od czasu do czasu (1-3 razy w czasie obserwacji)	Wzrasta często o ponad 15% (> 3 razy w czasie obserwacji)	Stale podwyższone > 15%